

Marianne Stougaard, Speciallæge i øre-, næse-, og halssygdomme
Taastrup Hovedgade 73,4., 2630 Taastrup
Tlf.: 43 99 37 89

OPERATIONSTID

Barnet skal møde **fastende**, dvs., at barnet

ikke må spise eller drikke fra aftenen før kl. 00:00/midnat

Barnet må dog gerne drikke **VAND** fra vandhanen indtil 2 timer før operationen.

Til børn, der er meget bange gives evt. Diazepam, der er et beroligende middel, som barnet skal have 2 timer før operationen. Må kun skylles ned med 1/3 kop vand fra vandhanen (**ikke mælkeprodukter eller juice**).

Ved fjernelse af POLYPPER eller mindskning af MANDLER, gives Panodil 2 timer før operationen (lægeordineret dosis). Hvis Panodil gives som tabletter, må de kun skylles ned med 1/3 kop vand fra vandhanen (**ikke mælkeprodukter eller juice**).

Pårørende medfølger og er sammen med barnet, indtil det er faldet i søvn. Går derefter ud under selve indgrebet.

Pårørende passer barnet under opvågningen, der ofte sker under gråd.

DRÆNBEHANDLING giver almindeligvis ikke smerter efter operationen. Få kan have moderat hovedpine efter bedøvelsen. Der kan være ømhed i mund og hals efter tryk af instrumenter i forbindelse med bedøvelsen, når der er fjernet POLYPPER eller mindsket MANDLER.

Bedøvelsen, operationen og opvågningstiden varer ca. ½ time. Barnet vil efter denne tid være helt vågen, men fortsat søvngig indtil det har sovet hjemme. Det er ikke hensigtsmæssigt at have søskende med til operationen.

Såfremt man selv er kørende **SKAL** der være en med til at tage sig af barnet under kørslen.

Hvis barnet på operationsdagen bliver syg eller på anden måde er forhindret i at blive opereret, kan der ringes afbud på operationsdagen mellem 07:30 - 08:00.

Med venlig hilsen

Marianne Stougaard

Redigeret 4. april 2014